Диагностический Лабораторный Центр "БиоТехМед"
тел./факс: (812) 746-54-77(многоканальный); E-mail:lab@biotechmed.ru

НАПРАВЛЕНИЕ
на лабораторное обследование

!!! Заполнять только печатными буквами !!!

Ф.И.О. Пациента

Дата рождения: число / месяц / год Пол: муж жен Для женщин: (на момент взятия крови) день цикла или неделя беременности

Диагноз:

Указать :
-Суточный диурез, в мл:
-Вес в кг: -Рост в см:

Ф.И.О. **Врача** Направляющее **ЛУ**

Необходимые исследования отметить крестиком:

Исследования методом Высокоэффективной жидкостной

Исследования :	кровь	суточн. моча
Фармакокинетика-1 определение_____ (Ламотриджин (ламиктал) Карбамазепин (финлепсин),Вимпат (лакосамид),Фенобарбитал,Бензонал,Гексамедин,Дифенин, Суксилеп,Кеппра (конвилепт, левитерацетам),Ванкомицин,Гексамедин,Ропивокаин, Дабигатран,Доксорубицин) и др.		
Кортикостероиды свободные (кортизол, кортикостерон, кортизон,S)		
Катехоламины(A, NA, DA)		
Серотонин, метаболиты Тирозина и триптофана		
Метанефрины общие		
Метанефрин и Норметанефрин свободный		
Ванилилминдальная кислота, Гомованилиновая кислота, 5-Гидроксииндолуксусная кислота		
Аминокислоты		
Фенилаланин-тирозин		
Кортикостероиды (кортизол,кортизон)		
Витамины A, E(жирорастворимые)		

- консервант HCl - ОСТОРОЖНО!!!

Дата взятия образца: Время взятия образца: час мин: Количество пробирок: Медсестра _____

Диагностический Лабораторный Центр,
"БиоТехМед", СПб, В. Алексеева 21, т./ф. (812)746-54-77; lab@biotechmed.ru

Инструкция по сбору суточной мочи на определение метанефринов, катехоламинов, ванилилминдальной и гомованилиновой кислот, серотонина

Подготовка Пациента к лабораторному обследованию: За 3-7 дней до сдачи анализа исключить из рациона бананы, ананасы, помидоры, свеклу, шоколад, ванилин, сыр, тонизирующие напитки (крепкий чай, кофе, кока-колу). Необходимо по возможности, исключить витамины и лекарственные препараты, особенно, антибиотики тетрациклинового ряда, хинин, хинидрин, альдомет, резерпин, исмелин, элениум, ингибиторы моноаминоксидазы, дофа, цереброназим.

Накануне сдачи рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи (свекла, морковь и пр.), не принимать диуретики. Перед сбором мочи надо произвести тщательный гигиенический туалет половых органов. Женщинам не рекомендуется сдавать анализ во время менструации.

До начала сбора мочи необходимо получить в лаборатории:

1) бланк направления, 2) инструкцию по сбору мочи, 3) консервант HCl*, 4)мерную емкость для сбора суточной мочи, 5) контейнер объёмом 20 -30 мл.

Порядок сбора суточной мочи:

1. До начала сбора полученный консервант HCl -соляную кислоту* вылить в емкость для сбора мочи (20 мл на 1 литр мочи).
2. При первом мочеиспускании полностью опорожнить мочевой пузырь (данная порция мочи не собирается!). Рекомендуется записать время первого мочеиспускания.
3. В дальнейшем, начиная со второго мочеиспускания, собирать всю выделяемую мочу в течении суток.
4. Последний сбор мочи должен быть произведен ровно через 24 часа после первого мочеиспускания (которое не собиралось)!
5. Мочу собирать в пластиковую мерную ёмкость, заранее полученную в лаборатории.
6. Желательно собирать и ту мочу, которая выходит во время дефекации (особенно при значительном мочевыделении).
7. На протяжении всего периода сбора мочи контейнер хранить в холодильнике при температуре + 4-8° С. Замораживание недопустимо!
8. После завершения сбора мочи за сутки необходимо:
   a. Измерить количество выделенной за сутки мочи (согласно рискам на мерной ёмкости) и записать в бланк направления;
   b. Отобрать порцию мочи из контейнера с суточной мочой для доставки в лабораторию, для чего использовать контейнер объёмом 20 -30 мл, заранее полученный в лаборатории;
   c. На контейнере передаваемом в лабораторию написать свою Фамилию и Инициалы;
   d. Доставить отобранную порцию мочи в маленьком контейнере (всю мочу приносить не требуется!) в лабораторию в течении 24 часов.

*** КОНСЕРВАНТ -СОЛЯНАЯ КИСЛОТА* - ОСТОРОЖНО!!!** КОНСЕРВАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАЗБАВЛЕННУЮ СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ, - НЕ ПИТЬ, НЕ РАЗБРЫЗГИВАТЬ, ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТЫЕ ПРОМЫТЬ СНАЧАЛА ВОДОЙ, ЗАТЕМ СЛАБЫМ РАСТВОРОМ СОДЫ.